

Protocolo	Tumor	Criterios	ECOG	Stage	Marcador	Activo?	Enroll?	Ramas de tratamiento
BNT-113	Cabeza y cuello	Etapa IV metastasico irresecable) , ECOG 0-1. PD-L1 [CPS ≥1]. Sin terapia previa. Ubicaciones elegibles: orofaringe, la cavidad oral, la hipofaringe y la laringe. (No en nasofaringe)	0-1	IV	PD-L1	Si	Si	A: BNT113 B: Pembrolizumab
ZW25-301	Gástrico/UGE	Etapa IV metastasico irresecable) , ECOG 0-1, sin tratamiento previo.HER2 +.	0-1	IV	HER2 +	Si	Si	A: Zanidatamab + CAPEOX + Tislelizumab B: Zanidatamab + CAPEOX
20210096 Fortitude 101 (Amgen)	Gástrico/UGE	Etapa IV metastasico irresecable), ECOG 0-1, sin tratamiento previo, con sobreexpresión de FGFR2b	0-1	IV	FGFR2b	Si	Si	A: Bemaratizumab + FOLFOX B: Placebo + FOLFOX
20210098 Fortitude 102 (Amgen)	Gástrico	Un estudio de fase 1b / 3 de quimioterapia con bemarituzumab más y nivolumab versus quimioterapia y nivolumab solos en sujetos con cáncer avanzado de la unión gástrica y gastroesofágica no tratado previamente con sobreexpresión de FGFR2b			FGFR2b	Si	Si	
CAPitello	Próstata	Etapa IV (metastásico), ECOG 0-1, hormono sensible, PTEN+	0-1	IV	PTEN+	Si	Si	A: Capivasertib + Docetaxel B: Placebo + Docetaxel
IMbrave 251	Hepato carcinoma	Etapa IV en (metastásico irresecable, ECOG 0-1, post Atezolizumab - Bevacizumab, Child-Pugh clase A.	0-1	IV		Si	Si	A: Atezolizumab + Lenvatinib o Sorafenib B: Lenvatinib + Sorafenib
RELATIVITY-127	Melanoma	Etapa IV (metastásico o localmente avanzado irresecable), ECOG 0-1, Sin tratamiento previo	0-1	IV		Si	Si	A: Relatlimab + Nivolumab B: Nivolumab
20220083	Melanoma	Melanoma resecado dentro de las 12 semanas antes de aleatorizacion (E III o estadio IV resecados)		III o IV		Si	Si	A: ABP 206 B: Nivolumab (Opdivo).
MOUNTAINEER-03 (SGTUC-029)	Colorrectal	Etapa IV (metastasico o localmente avanzado irresecable), ECOG 0-1, Adenocarcinoma, HER2+, RAS WT. Sin evidencia de metástasis cerebrales o Metástasis cerebrales previamente tratadas que son asintomáticas.	0-1	IV	HER2+, RAS	Si	Si	A: Tucatinib + Trastuzumab + FOLFOX B: FOLFOX + Bevacizumab o Cetuximab
MK-1084-001	Multitumoral	Etapa IV (metastásico), ECOG 0 - 1, (TPS) ≥1%, mutación KRASG12C. Sin tratamiento previo. (Esperando nuevas cohortes) - Enmienda 4 (Pulmón, Colon, Ovario, Pancreas), Cabe recalcar que colon hasta 2L.	0-1	IV	KRASG12C	Si	Si	A: MK-1084 + Pembrolizumab
MK7684A-003	Pulmón	Etapa IV (metastásico), ECOG 0-1, Cáncer de pulmón de células no pequeñas, PDL1+.	0-1	IV	PDL1+	Si	Si	A: Pembrolizumab/Vibostolimab B: Pembrolizumab
DS1062-A-U304 TROPION- Lung08	Pulmón	Pacientes con NSCLC en estadio IV, ECOG 0-1, sin tratamiento previo, PD-L1 >50%. Testea Mutaciones	0-1	IV	PD-L1 >50%	Si	Si	A: Dato-DXd + Pembrolizumab B: Pembrolizumab
MB12-C-01-22 (ELEA)	Pulmón	Pacientes con NSCLC en estadio IV, ECOG 0-1, sin tratamiento previo, PD-L1 >50%. No testea mutaciones	0-1	IV	PD-L1 >50%	Si	Si	A: Pembrolizumab B: Pembrolizumab biosimilar
PM1183-C-008-21 LAGOON	Pulmón	Pacientes con SCLC en estadio IV, ECOG 0 -2, Una línea previa de quimioterapia con platino con/sin anti-PD-1 o anti-PD-L1	0-2	IV	anti-PD-1	Si	Si	A: Lurbinectedin B: Lurbinectedin + Irinotecan C: Irinotecan o Topotecan
DS1062-A-U303 TROPION- Lung07	Pulmón	Cancer de pulmon de celulas no pequeñas PD-L1 TPS <50%, sin tratamiento previo.		IIIB o IIIC	PD-L1 TPS <50%	Si	Si	A: Datopotamab Deruxtecán + Pembrolizumab + QMT
ADCT - 402 - 311 (Lotis 05)	Hematológico	linfoma difuso de células B en recaída o refractarios.No candidato para el trasplante de células madre.				Si	Si	A: Loncastuximab Tesirina + Rituximab B: Rituximab + Gemcitabina + Oxaliplatin
(MK-1026-008) (ARQ 531)	Hematológico	Linfoma no Hodgkin (LNH) de células B, leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma linfocítico pequeño (SLL).				Si	Si	A: Nemtabrutinib B: Fludarabine + ciclofosfamida+ rituximab ó BIEN Bendamustina + rituximab
MK-2140-006-01	Hematológico	Estudio basket multicéntrico, de etiqueta abierta y de fase 2 para evaluar la seguridad y eficacia de MK-2140 como monoterapia y en combinación en participantes con neoplasias de células B agresivas y de bajo grado.				Si	Si	A: Zilovertamab vedotin B: Zilovertamab vedotin + Nemtabrutinib
MK-1026-010 (BELLWAVE-010)	Hematológico	Estudio aleatorizado, de etiqueta abierta, de fase 3 para comparar la eficacia y la seguridad de nemtabrutinib (MK-1026) más venetoclax frente a venetoclax más rituximab en participantes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas recidivantes/refractarios después de al menos 1 tratamiento previo.				Si	Si	A: Nemtabrutinib + Venetoclax B: Venetoclax + Rituximab